

Chirurgiczna dezynfekcja rąk


Metoda nacierania zgodnie z CEN/EN 12791

Należy przygotować:

- Łatwo dostępne miejsce do mycia rąk z bieżącą ciepłą i zimną wodą.
- Dozowniki preparatów z łagodnym płynem do mycia, środkiem do dezynfekcji rąk i odpowiednie środki do pielęgnacji skóry.
- Ręczniki jednorazowego użytku.
- Armatura i dozowniki muszą mieć możliwość obsługi bezdotykowej.

Zalecenia:

- Na dłoniach i przedramionach nie można nosić biżuterii, zegarków, pierścionków.
- Zaleca się, aby ze względu na niebezpieczeństwo perforacji rękawiczek paznokcie nie wystawały poza opuszkę palców.
- Nie są zalecane sztuczne paznokcie oraz lakier, gdyż utrudnia to utrzymanie higieny rąk.



1. Z bezdotykowego dozownika pobrać na suchą skórę dłoni preparat do dezynfekcji.

2. Dłonie i przedramiona aż do łokci pocierać przynajmniej 1,5 minuty.

3-8. Dłonie dezynfekować zgodnie z higieniczną metodą dezynfekcji rąk.

9. Dłonie podczas całego procesu dezynfekcji trzymać powyżej linii łokci. Przed nałożeniem rękawic operacyjnych dłonie muszą wyschnąć samoczynnie.

i Dłonie i przedramiona muszą pozostać mokre w czasie działania preparatu, w razie potrzeby należy kilkakrotnie pobrać preparat do dezynfekcji (w sumie przynajmniej 10 ml).