

Wskazania		Antybiotyk	Dawkowanie	
			Dorośli (mc 70 kg)	Dzieci
Terapia przyzębia	Ostre ropnie mnogie	Amoksycylina	250-500 mg co 6 godz.	50 mg/kg/d w 4 dawkach podzielonych
	Ostre zapalenie dziąseł ze współistniejącymi objawami ogólnymi lub w przebiegu ciężkich chorób ogólnoustrojowych	Amoksycylina + kwas klawulanowy Cefalosporyna Jeśli pacjent jest uczulony lub brak poprawy, lub ciężkie zakażenie Tetracyklina – Doksycyklina – Minocyklina Klindamycyna	375-625 mg co 8 godz. 250-500 mg co 6 godz. 200 mg początkowo, następnie 100 mg raz na dobę 300 mg co 6 godz. 600 mg co 12 godz.	nie stosować do 12. r.ż. 25-50 mg/kg/d w dawkach podzielonych nie stosować do 12. r.ż. 15-25 mg/kg/d w 3-4 dawkach podzielonych
	Ostre martwiczo-wrzodzące zapalenie dziąseł/przyzębia	Metronidazol Amoksycylina Klindamycyna	250 mg co 8 godz. 250-500 mg co 6 godz. 300 mg co 6 godz. 600 mg co 12 godz.	30 mg/kg/d w 4 dawkach podzielonych 50 mg/kg/d w 4 dawkach podzielonych 15-25 mg/kg/d w 3-4 dawkach podzielonych
	Agresywne zapalenie przyzębia	Amoksycylina + Metronidazol	250-500 mg co 6 godz. 250-500 mg co 8 godz.	
	Zapalenie przyzębia oporne na leczenie	Amoksycylina + Klindamycyna	250-500 mg co 6 godz. 600 mg co 12 godz.	
Zakażenia endodontyczne	Gdy występuje reakcja ogólnoustrojowa lub gdy zakażenie się rozprzestrzeni (gorączka, złe samopoczucie, zapalenie tkanki łącznej, szczękoscisk, obrzęk podniebienia miękkiego, dna jamy ustnej lub innych przestrzeni anatomicznych)	Amoksycylina Amoksycylina + kwas klawulanowy Tetracyklina -Doksycyklina -Minocyklina Klindamycyna	250-500 mg co 6 godz. 250-500 mg co 6 godz. 600 mg co 12 godz. 200 mg początkowo, następnie 100 mg na dobę 300 mg co 6 godz. 600 mg co 12 godz.	50 mg/kg/d w 4 dawkach podzielonych nie stosować do 12. r.ż. nie stosować do 12. r.ż. 15-25 mg/kg/d w 3-4 dawkach podzielonych
Zakażenia zębopochodne	Szczególnie u pacjentów z obniżoną odpornością i u dzieci	Amoksycylina Amoksycylina + kwas klawulanowy Cefalosporyna Klindamycyna Tetracyklina – Doksycyklina – Minocyklina	250-500 mg co 6 godz. 250-500 mg co 6 godz. 600 mg co 12 godz. 250-500 mg co 6 godz. 300 mg co 6 godz. 600 mg co 12 godz. 200 mg początkowo, następnie 100 mg na dobę	50 mg/kg/d w 4 dawkach podzielonych nie stosować do 12. r.ż. 25-50 mg/kg/d w dawkach podzielonych 15-25 mg/kg/d w 3-4 dawkach podzielonych nie stosować do 12. r.ż.
Oslona antybiotykowa	U pacjentów bardzo wysokiego ryzyka IZW: IZW w wywiadzie, sztuczne zastawki serca, zwężenie cieśni aorty, wprowadzenie cewnika do lewej połowy serca U pacjentów wysokiego ryzyka i umiarkowanego ryzyka IZW oraz u pacjentów z protezami ortopedycznymi, poddanych immunosupresji i hemodializowanych	Amoksycylina lub Klindamycyna	1000 mg jednorazowo 1 godz. przed zabiegiem stomatologicznym 600 mg jednorazowo 1 godz. przed zabiegiem stomatologicznym	